

Nombre: _____ Fecha: _____ Género: () F () M Edad: _____

NIDA-MODIFIED ASSIST (NMA)– CHAMP Modificado Formato de entrevista

Introducción (Léasela al paciente)

Hola, soy _____, es un gusto conocerlo. Si le parece bien, me gustaría hacerle unas preguntas que me ayudarán a brindarle una mejor atención médica. Las preguntas están relacionadas a su experiencia con el uso de opioides. Algunas de estas sustancias que mencionaremos son recetadas por un médico; pero solo registraré el uso de dichas sustancias si las ha tomado por razones o en dosis diferentes a las indicadas. También le preguntaré sobre el uso ilícito o ilegal de drogas, pero solo para un mejor diagnóstico y tratamiento.

Instrucciones: En cada pregunta, indique la respuesta del paciente en la columna apropiada con un (✓). Por ejemplo, en la pregunta 1, si el paciente indica que ha usado opioides recetados semanalmente en los últimos 3 meses, marque con un (✓) la columna "Semanalmente".

Uso de opioides recetados distinto al indicado, P1-6

Los opioides recetados incluyen el fentanilo, la oxiconona [OxyContin, Percocet], la hidrocodona [Vicodin], la metadona, la buprenorfina, tramadol etc.

En los últimos 3 meses...	Nunca	Una o dos veces	Mensualmente	Semanalmente	Diariamente o casi todos los días
1. ¿Con qué frecuencia ha usado opioides recetados? SI LA RESPUESTA ES "NUNCA" HABER USADO OPIOIDES RECETADOS DISTINTO AL INDICADO, CONTINUAR DESDE LA PREGUNTA 7	0	2	3	4	6
2. ¿Con qué frecuencia ha tenido un fuerte deseo o ganas de usar opioides recetados?	0	3	4	5	6
3. ¿Con qué frecuencia el uso de opioides recetados le generaron problemas de salud, sociales, legales o financieros?	0	4	5	6	7
4. ¿Con qué frecuencia no ha logrado hacer lo que normalmente se esperaba de usted debido al uso de opioides recetados?	0	5	6	7	8
En su vida...	No, nunca	Sí, pero no durante los últimos 3 meses		Sí, en los últimos 3 meses	
5. ¿Alguna vez un amigo, familiar o conocido se ha preocupado por su uso de opioides recetados?	0	3		6	
6. ¿Alguna vez ha fallado en intentar controlar, reducir o abandonar el uso de opioides recetados?	0	3		6	

Uso de opioides que se venden en su comunidad, P7-12

Los opioides que se venden en su comunidad pueden ser fentanilo, heroína, opio, kratom, etc..

En los últimos 3 meses...	Nunca	Una o dos veces	Mensualmente	Semanalmente	Diariamente o casi todos los días
7. ¿Con qué frecuencia ha usado opioides que se venden en su comunidad? SI LA RESPUESTA ES "NUNCA", SE TERMINA EL CUESTIONARIO	0	2	3	4	6
8. ¿Con qué frecuencia ha tenido un fuerte deseo o ganas de usar opioides que se venden en su comunidad?	0	3	4	5	6
9. ¿Con qué frecuencia el uso de opioides que se venden en su comunidad le generaron problemas de salud, sociales, legales o financieros?	0	4	5	6	7
10. ¿Con qué frecuencia no ha logrado hacer lo que normalmente se esperaba de usted debido al uso de opioides que se venden en su comunidad?	0	5	6	7	8
En su vida...	No, nunca	Sí, pero no durante los últimos 3 meses		Sí, en los últimos 3 meses	
11. ¿Alguna vez un amigo, familiar o conocido se ha preocupado por su uso de opioides que se venden en su comunidad?	0	3		6	

Nombre: _____ Fecha: _____ Género: () F () M Edad: _____

12. ¿Alguna vez <u>ha</u> fallado en intentar controlar, reducir o abandonar el uso de opioides que se venden en su comunidad?	0	3	6
--	---	---	---

NIDA-MODIFIED ASSIST (NMA)– Modificado Puntaje

Instrucciones: Para cada sustancia – opioides recetados o que se venden en su comunidad – sume los puntajes obtenidos en las 6 preguntas. Este es el puntaje de Uso de Sustancias.

Opioides recetados		Opioides que se venden en su comunidad	
Pregunta número	Puntaje	Pregunta número	Puntaje
P1		P7	
P2		P8	
P3		P9	
P4		P10	
P5		P11	
P6		P12	
Total		Total	

Instrucciones: Utilice el Puntaje de Consumo de Sustancias para identificar el nivel de riesgo del paciente. Para determinar el nivel de riesgo del paciente basado en su Puntaje de Uso de Sustancias, consulte la siguiente tabla:

Nivel de riesgo asociado a los distintos rangos de Puntaje de Uso de Sustancias por el uso de drogas ilícitas o que no han sido recetadas por un médico.	
0-3	Riesgo bajo
4-26	Riesgo moderado
+27	Riesgo alto